

PRECAUCIONES

Peligroso para personas y animales domésticos

ATENCIÓN: Perjudicial en caso de ingerirse o de ser absorbido por la piel. Ocasiona irritación moderada en los ojos. Manténgalo fuera del alcance de los niños, animales domésticos y mascotas. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Todos quienes lo manipulen (incluyendo a quienes lo apliquen) deben usar camiseta de mangas largas y guantes. Toda persona que recoja animales muertos o cebos sin utilizar después de la aplicación de este producto debe usar guantes.

Requisitos para la seguridad del usuario: Siga las instrucciones del fabricante para limpiar y mantener el equipo de protección personal (EPP). Si no hay instrucciones para las prendas lavables, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP separado del resto de la ropa para lavar. Quitese el EPP inmediatamente después de manipular este producto. Lave la parte exterior de los guantes antes de quitárselos. Tan pronto como pueda, lávese las manos minuciosamente después de la aplicación de los cebos y antes de comer, beber, mascar goma, usar tabaco o usar el baño, y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS

Tenga esta etiqueta a mano cuando le aconsejen un tratamiento.

Si se ingiere: Llame a un centro de control de envenenamiento, a un doctor o al 1-800-858-7378* de manera inmediata para que le aconsejen un tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que se lo indique el centro de control de envenenamiento o el médico. No administre nada por boca a una persona inconsciente.

Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quitese la ropa contaminada. Enjuague la piel de manera inmediata con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un doctor para que le aconsejen un tratamiento.

Si hay contacto con los ojos: Mantenga abierto el ojo y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitese los lentes de contacto, en caso de usarlos, después de los primeros cinco minutos y luego continúe enjuagando. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un doctor para que le aconsejen un tratamiento. *Además, llame a este número para obtener información sobre problemas de salud o incidentes con pesticidas.

TRATAMIENTO POR ENVENENAMIENTO DE MASCOTAS: Si el animal come algún cebo, llame al veterinario de inmediato.

NOTA PARA EL MÉDICO O VETERINARIO: Contiene la neurotoxina brometolina. No es un ratificida del tipo de los anticoagulantes. En el caso de seres humanos o animales que ingieran cebos o muestren signos de envenenamiento (como temblores musculares, pérdida de función de las patas traseras o ataques en animales), limite la absorción mediante el vómito o el lavado gástrico. En caso de existir síntomas subletales, serán el resultado de un edema cerebral y deberán tratarse de manera adecuada mediante la administración de un diurético osmótico y corticosteroides.

PELIGROS AMBIENTALES: Este producto es extremadamente tóxico para los mamíferos y pájaros. Los perros y los mamíferos y pájaros carroñeros pueden sufrir envenenamiento si se alimentan de animales que hayan comido el cebo. No lo aplique directamente al agua o en áreas donde haya agua superficial, o en zonas intermareales que estén debajo de la marca de agua máxima promedio. Los residuos líquidos también pueden resultar peligrosos para los organismos acuáticos en aguas cercanas a las zonas tratadas. No contamine el agua al deshacerse del agua utilizada para lavar o enjuagar los equipos.

ALMACENAMIENTO Y DESCARTE

No contamine el agua, la comida o el forraje mediante el almacenamiento y el desecho.

Almacenamiento del pesticida: Guárdelo en el envase original, en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños y las mascotas. Mantenga los envases cerrados y alejados de otros productos químicos. **Desecho del pesticida:** Los desechos que se producen por el uso de este producto se pueden eliminar en una instalación aprobada para la eliminación de desechos.

Manipulación del envase: Este envase no es recargable. No vuelva a utilizarlo o cargarlo. Enjuague tres veces (o su equivalente) y luego ofrézcalo para que sea reciclado o recondicionado o perfórelo y deséchelo en un vertedero sanitario o incinerelo. En la mayoría de los estados no se permite la incineración.

AVISO DE GARANTÍA: El comprador asume toda la responsabilidad de seguridad y uso del producto en caso de no estar de acuerdo con las instrucciones.

EPA Reg. No. 67517-66-7173
EPA Est. No. 7173-WI-1

GUNSLINGER® MINI BLOQUES

Este producto puede utilizarse sólo dentro
de edificios o a menos de 50 pies de ellos o dentro
de vehículos de transporte
(embarcaciones, trenes o aeronaves)

CONTROL EFECTIVO PARA ROEDORES
DE INTERIORES Y EXTERIORES
MATA RATAS NORUEGAS,
RATAS DE TEJADO Y RATONES DOMÉSTICOS
RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL CLIMA

Las ratas noruegas, las ratas de tejado y los ratones domésticos
suelen consumir una dosis tóxica en una sola noche pero, a partir del
consumo del cebo, les puede llevar dos o más días morir. Dado que
interrumpe la acción de alimentación, los roedores dejan de
alimentarse después de consumir una dosis tóxica. Este producto es
eficaz para combatir las ratas y ratones domésticos resistentes a los
productos anticoagulantes.

Ingrediente activo: bromethalin (CAS No.63333-35-7) 0.01%
Otros Ingredientes 99.99%
Total 100.0000%

MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS
ADVERTENCIA

Puede resultar fatal si se ingiere.

Para ver precauciones adicionales consulte el panel lateral.

LIPHATECH®

Liphatech, Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI 53209
(800) 351-1476

INSTRUCCIONES DE USO

Es una contravención de la ley federal usar este producto de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta.

LEA ESTA ETIQUETA: Lea la etiqueta completa y siga todas las instrucciones y precauciones de uso. Utilícelo solamente para los lugares y las plagas que se especifican en esta etiqueta, respetando los métodos de aplicación incluidos en ella.

IMPORTANTE: No exponga a los niños, mascotas u otros animales inofensivos a los ratificidas. Para ayudar a prevenir accidentes:

1. Almacene el producto que no esté en uso fuera del alcance de niños y mascotas.
2. Aplique el cebo en lugares fuera del alcance de los niños, mascotas, animales domésticos y animales salvajes inofensivos, o bien póngalo en trampas de cebo resistentes a las alteraciones. Estas trampas deben ser resistentes a la destrucción por parte de perros y niños menores de seis años de edad y deben usarse de tal manera que eviten que dichos niños lleguen a los compartimientos del cebo y tomen contacto con él. Si el cebo puede salirse de las trampas al levantarlas, las unidades deben estar sujetas o fijadas de alguna otra manera. Se necesitan trampas todavía más resistentes en áreas donde puedan acceder animales con pezuñas, mapaches, osos u otros animales potencialmente destructivos o en áreas propensas al vandalismo.
3. Descarte el recipiente del producto y el cebo no utilizado, estropeado o no consumido según se especifica en esta etiqueta.

Nota: Las trampas de cebo deben utilizarse en exteriores, sobre la superficie. Se deben utilizar trampas de cebo resistentes a las alteraciones si hay niños, mascotas, mamíferos inofensivos o pájaros que podrían tener acceso al cebo

RESTRICCIONES DE USO: Este producto puede utilizarse solamente para controlar las ratas noruegas, las ratas de tejado y los ratones domésticos adentro y afuera hasta una distancia de 50 pies de edificios de uso industrial y agrícola, de edificios terminales o portuarios y en estructuras similares hechas por el hombre. Este producto también puede usarse en alcantarillas y hasta una distancia de 50 pies de edificios cercanos, en callejones y dentro de vehículos de transporte (embarcaciones, trenes y aeronaves). Para ser usado en áreas sin alimentos ni forraje.

RESTRICCIONES DE USO: No colocar cerca o dentro de aberturas o conductos de ventilación. No contaminar el agua, los alimentos, el forraje ni el equipo para manipular alimentos, forraje, leche o carne o superficies que entren en contacto directo con alimentos. No esparcir el cebo. No aplicar a más de 50 pies de los edificios. No vender este producto en contenedores individuales con una capacidad menor a 4 libras de cebo.

Selección de las áreas de tratamiento: Determine las áreas donde es más probable que encuentren y consuman el cebo las ratas y los ratones domésticos. En general, es a lo largo de las paredes, en aberturas roídas, dentro o al lado de madrigueras, en rincones y lugares ocultos, entre pisos y paredes o en lugares donde se hayan visto roedores o señales de su presencia. Retire tantos alimentos alternativos accesibles a los roedores como sea posible.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El ingrediente activo de este producto es diferente al de los ratificidas anticoagulantes. Las ratas y los ratones individuales dejan de alimentarse después de consumir una dosis tóxica. Para aplicaciones en alcantarillas, enhebre el cable en el bloque y sujételo bien a una estructura fija, como el escalón inferior de la escalera de una boca de alcantarilla o su rejilla. Deje la cantidad suficiente de cable para que el bloque quede apoyado en el banco de la boca de la alcantarilla. Si no existe ningún banco, suspenda el bloque a pocas pulgadas por encima del nivel máximo de agua o sujete el bloque en una tabla que esté sostenida por escalones opuestos de la escalera. Al asegurar el bloque de esta manera, usted ayudará a reducir las probabilidades de que las ratas o el agua lo quiten. Utilice un bloque por boca de alcantarilla. Mantenga un suministro continuo de cebo fresco durante al menos 10 días o hasta que cesen las señales de presencia de ratas.

Ratas: Use guantes y aplique de 2 a 12 cebos por punto de colocación en áreas infestadas. Separe las colocaciones en distancias de 20 a 30 pies.

Ratones domésticos: Use guantes y aplique de 1 a 2 cebos por punto de colocación en áreas infestadas. Separe las colocaciones en distancias de 8 a 12 pies.

Seguimiento: Ajuste la cantidad de cebo aplicada al nivel de alimentación esperada de las ratas y los ratones en cada punto de colocación del cebo. Se espera que el mayor consumo de cebo suceda en el primer o segundo día después del tratamiento. Después de varios días, inspeccione las colocaciones y reponga el cebo en los lugares donde se hayan alimentado mucho o donde exista evidencia continua de presencia de ratas y ratones. Mantenga el cebo por lo menos durante una semana y continúe colocándolo hasta que cese la actividad de las ratas y los ratones o sea evidente que el resto de esas ratas y ratones no se sientan atraídos por el cebo. Con el uso de guantes, quite y deseche de manera correcta las ratas y los ratones muertos y el cebo restante. Para desalentar la reinfestación, limite todo lo posible las fuentes de alimentos de ratas y ratones, la disponibilidad de agua y los lugares aptos para madrigueras. Si ocurre la reinfestación, repita el tratamiento. En caso de haber infestación continua, establezca estaciones permanentes de cebo y repóngalo cuando sea necesario.

(121610)